

CT - kolografi - efter koloskopi

Til patienter og pårørende

Røntgenundersøgelse af tyktarmen

Forberedelse

Din kikkertundersøgelse af tyktarm (koloskopi) kunne ikke gennemføres, derfor får du tilbudt en supplerende røntgenundersøgelse (CT-kolografi, virtuel kikkertundersøgelse).

Du skal fortsætte med flydende kost, dvs. tynde væsker uden "fyld", f.eks. bouillon/klar suppe, Gerne sukkerholdige væsker, så som saftvand, sodavand, juice (uden frugt). Vand, kaffe og the, men **ingen mælkeprodukter!**

For at markere eventuelle rester af afføringen i tarmen drikkes den medgivne kontrastvæske (30 ml kontrast) blandet med en 1/2 liter vand eller saft kl. 18:00.

Herefter er det vigtigt, at du drikker minimum 1 liter tynde væsker. Du må gerne drikke tynde væsker indtil 2 timer før mødetid næste formiddag, herefter skal du faste.

Kontrastvæsken kan yderst sjældent give diarree eller medføre kvalme eller mavesmerter. Hvis du oplever kraftige mavesmerter eller dårlig almentilstand, skal du kontakte kirurgisk afdeling og bede om vagthavende læge, eller kontakte Læge- og Skadevagten.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du får blæst luft (kuldioxid) i tyktarmen via en lille slange, som indføres i endetarmen. Herefter foretages skanningen, først liggende på ryggen, dernæst liggende på maven. Det hele tager ca. 1 time.

I forbindelse med selve undersøgelsen er det nødvendigt at give dig en indsprøjtning i armen med et tarmafslappende middel. Dette hjælper os med at skelne detaljerne på billederne.

Komplikationer

Der kan være kortvarige luftgener. Undersøgelsen er ellers meget sikker og medfører kun yderst sjældent risiko for hul på tarmen.

Efter undersøgelsen

Det afslappende middel kan medføre et sløret syn i op til 4 timer, hvorfor ledsager til bilkørsel påkræves. Det anbefales at spise og drikke som sædvanligt.

Du skal møde i Røntgen & Skanning Aabenraa

_____ dag den _____ Kl. _____

Du er altid velkommen at kontakte os på Tlf.: 79 97 51 00