

Analysenavn	P—Immunglobulin M; massek.		
Kortnavn	Immunglobulin M;P		
Synonym	-		
Forkortelse	IGM		
IUPAC - kode	NPU19825		
Kvantitetsnummer	001018		
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt		
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.		
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4,5		
Referenceinterval	≥ 0 dage	- < 1 måned	0,00 - 0,65 g/L
	≥ 1 måned	- < 2 år	0,00 - 1,30 g/L
	≥ 2 år	- < 7 år	0,30 - 1,84 g/L
	≥ 7 år	- < 10 år	0,21 - 1,65 g/L
	≥ 10 år	- < 13 år	0,27 - 2,11 g/L
	≥ 13 år	- < 16 år	0,26 - 2,25 g/L
	≥ 16 år		0,40 - 2,30 g/L
Analyseusikkerhed	4 %		
Unormale værdier	<p>Forhøjet akut og subakut ved en række udbredte infektioner, hepatitis, cirrhose, Waldenströms makroglobulinæmi, sarkoidose og reumatoid arthritis.</p> <p>Nedsatte værdier ses ved cytotoxisk behandling, kronisk lymfatisk leukæmi og myelomatose af ikke IGM type.</p> <p>IGM passerer ikke placenta, hvorfor fund af specifikke IGM antistoffer i blodet hos den nyfødte indikerer medfødt infektion.</p>		

Seneste opdatering 18.04.15