

Analysenavn	U—Albumin/Creatininium; masseratio
Kortnavn	Albumin / Kreatinin ratio;U
Synonym	ALBCREA
Forkortelse	ALB/KREA-U
IUPAC - kode	NPU19661
Kvantitetsnummer	000068
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt Hvis U-Albumin er mindre end 3 mg/l, beregnes U-Albumin/creatinin ratio ikke.
Prøvemateriale	4,0 mL velblandet urin. Holdbarheden er 48 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Urinen sendes i U 4.0.
Referenceinterval	Mindre end 30×10^{-3}
Analyseusikkerhed	10 %
Unormale værdier	Forbigående albuminuri ses ved febrile tilstande, hjerteinsufficiens under vellykket behandling og efter fysisk anstrengelse. Urinvejsblødning eller inflammation giver også øget albuminudskillelse. Subklinisk nephropathi (eks. diabetisk, hypertensiv eller som ledsagende autoimmun sygdom) kan afsløres ved en let proteinuri. På grund af de mange mulige årsager til forhøjede værdier er det ofte rimeligt at kontrollere en forhøjet værdi efter nogle måneder.
Bemærkninger	Enheden 10^{-3} svarer til mg albumin pr. g creatininium i urin

Seneste opdatering 27.04.15