

Analysenavn	P—Immunglobulin G; massek.				
Kortnavn	Immunglobulin G;P				
Synonym	-				
Forkortelse	IGG				
IUPAC - kode	NPU19814				
Kvantitetsnummer	001009				
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt				
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.				
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5 .				
Referenceinterval	≥	0 dage	- <	1 måned	1,6 - 8,7 g/L
	≥	1 måned	- <	6 mdr.	1,4 - 5,3 g/L
	≥	6 mdr.	- <	1 år	1,3 - 8,2 g/L
	≥	1 år	- <	4 år	4,1 - 12,0 g/L
	≥	4 år	- <	7 år	4,7 - 13,3 g/L
	≥	7 år	- <	10 år	4,9 - 14,7 g/L
	≥	10 år	- <	13 år	5,9 - 16,2 g/L
	≥	13 år	- <	16 år	5,9 - 16,4 g/L
	≥	16 år			6,1 - 15,7 g/L
Analyseusikkerhed	4 %				
Unormale værdier	<p>Forhøjede værdier ses ved kroniske inflammationer f.eks. kronisk hepatitis, udbredte autoimmune sygdomme, reumatoid arthritis og myelomatose med IgG komponent.</p> <p>Nedsatte værdier ses ved medfødte former for hypogammaglobulinæmi, knoglemarvshypoplasi, nefrotisk syndrom, behandling med steroider eller cytotoxisk medicin samt ved myelomatose med en anden komponent end IgG.</p>				

Seneste opdatering 18.04.15